

## 【 予防接種を受けた後の一般的注意事項 】

### 【特注】

・インフルエンザワクチンと他のワクチンとの接種間隔はありません。

- 接種部位が痛む、硬くなる、赤く腫れる、だるいなどの軽い症状が接種後24時間以内に発症することがありますが、2～3日中には消失します。
- 接種後30分は、急な副反応がおきることがあります。
- 接種後24時間は体調の変化に気をつけ、高熱、けいれん、しびれ、息苦しい、繰り返す嘔吐、強度の下痢などがあれば、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- 接種当日は、大量の飲酒、激しい運動、過労、睡眠不足は避けて下さい。
- 接種当日の入浴はさしつかえありませんが、注射部位を強くこすらないで下さい。

※ 体調に変化があった場合は、お近くのスタッフにご相談下さい

### ■令和5年度(2023年)インフルエンザHAワクチン製造株

#### A型株

A/ビクトリア/4897/2022(IVR-238)(H1N1)

A/ダーウィン/9/2021(SAN-O10)(H3N2)

#### B型株

B/プーケット/3073/2013(山形系統)

B/オーストリア/1359417/2021(BVR-26)(ビクトリア系統)

### ◎ お問い合わせ

医療法人財団 綜友会 第二臨海クリニック

東京都江戸川区西葛西7-28-8

電話：03-5658-3558

お問い合わせ時間 月～金曜日 9:00～16:00

(医師不在時は、医師の診察が実施できない場合がございます  
ご了承の程お願いいたします)

※ 上記の時間帯以外は、お近くの病院へご相談下さい